



**Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
„Płazy i gady Polski”
(rok szkolny 2014/2015)**

ETAP SZKOLNY

.....
imię i nazwisko

.....
szkoła, klasa

.....
nauczyciel prowadzący

.....
liczba punktów

Zaznacz prawidłową odpowiedź

1. Który z wymienionych ptaków pospolicie występuje w Polsce w miastach?

- a) kuropatwa
- b) wilga
- c) kszczyk
- d) kopciuszek

7. Salamandra plamista dorasta przeciętnie:

- a) do 7 cm
- b) do 10 cm
- c) do 24 cm
- d) do 45 cm

2. Zębiełek karliczek należy do rodziny:

- a) ryjówkowate
- b) mroczkowate
- c) myszowate
- d) popielicowate

8. Podstawowy pokarm nocka dużego to:

- a) drobne gryzonie
- b) płazy
- c) owady
- d) owoce

3. Która z wymienionych ryb nie występuje w Bałtyku?:

- a) dorsz
- b) karaś pospolity
- c) szprot
- d) śledź

9. Środowisko wodne i podmokłe preferowane jest przez:

- a) węża Eskulapa
- b) zaskrońca
- c) żmiję zygzakowatą
- d) gniewosza plamistego

4. Żółw błotny:

- a) występuje w Polsce głównie w południowej części kraju
- b) odżywia się przede wszystkim roślinami
- c) zimuje na dnie zbiorników wodnych
- d) zapada w sen zimowy już w sierpniu

10. Który z wymienionych ptaków regularnie odlatuje z Polski na zimę?

- a) dzięcioł duży
- b) czubatka
- c) kruk
- d) pierwiosnek

5. Jerzyki:

- a) zazwyczaj odlatują z Polski do miejsc zimowania w październiku
- b) potrafią spać w powietrzu
- c) występują głównie na terenach podmokłych
- d) odżywiają się przede wszystkim owocami

11. Która z cech dotyczy rzekotki drzewnej?

- a) wydaje bardzo ciche odgłosy godowe
- b) samce bardzo wyraźnie różnią się od samic
- c) ubarwienie ciała zmienia się w zależności od różnych czynników
- d) w Polsce występuje wyłącznie w zachodniej i północnej części kraju

6. Smużka występuje głównie:

- a) w budynkach
- b) na terenach podmokłych
- c) w lasach i na łąkach
- d) w wyższych partiach gór

12. Żaba wodna jest mieszańcem:

- a) żaby śmieszki i żaby zwinki
- b) żaby jeziorkowej i żaby moczarowej
- c) żaby śmieszki i żaby jeziorkowej
- d) żaby moczarowej i żaby trawnej



**Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych
„Płazy i gady Polski”
(rok szkolny 2014/2015)**

ETAP SZKOLNY

13. Gniazdo remiza:

- a) umieszczone jest na ogół w dziupli
- b) ma kształt kulisty i rozwieszona jest zwykle pomiędzy trzciniami
- c) ma kształt worka, zawieszono zazwyczaj na gałęzi wierzby
- d) zbudowane jest z trawy i umieszczone na ziemi

19. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

- a) gągoł zakłada na ogół gniazdo wśród trzcini
- b) samiec czernicy posiada czub z tyłu głowy
- c) gęgawa nie odbywa lęgów w naszym kraju
- d) bocian czarny gniazduje głównie na budynkach

14. Które z wymienionych środowisk preferuje salamandra plamista?

- a) lasy iglaste na obszarach nizinnych
- b) górskie lasy liściaste i mieszane
- c) niewielkie, płytkie, zarośnięte zbiorniki wodne
- d) tereny rolnicze

20. Który z wymienionych płazów występuje głównie na terenach piaszczystych?

- a) kumak górski
- b) ropucha paskówka
- c) traszka zwyczajna
- d) żaba śmieszka

15. W którym rejonie Polski, w naturze, występuje obecnie suseł moręgowany?

- a) na Mazowszu
- b) na Podlasiu
- c) na Śląsku
- d) w Wielkopolsce

21. Niedźwiedź brunatny:

- a) rodzi swoje młode zimą
- b) nie potrafi pływać
- c) w Polsce występuje w Karpatach, Sudetach i w północno-zachodniej części kraju
- d) jest aktywny wyłącznie za dnia

16. Jaszczurka zwinka:

- a) jest żyworodna
- b) jest jajożyworodna
- c) składa jaja w wilgotnej glebie na łądzie
- d) składa jaja w wodzie

22. Odmiana turkusowa występuje u:

- a) jaszczurki żyworodnej
- b) padalca zwyczajnego
- c) zaskrońca
- d) kumaka górskiego

17. Która z cech dotyczy pustułki?

- a) gniazduje głównie nad dużymi zbiornikami wodnymi
- b) często zawisa w powietrzu energicznie trzepocząc skrzydłami
- c) odżywia się przede wszystkim owadami i małymi ptakami
- d) w Polsce występuje tylko w zachodniej części kraju

23. Które zdanie jest prawdziwe?

- a) grzebiuszka ziemna ma pionową żrenicę
- b) grzebiuszka ziemna poza okresem godowym występuje głównie na terenach podmokłych
- c) kijanki grzebiuszki ziemnej w Polsce osiągają maksymalnie 7 cm długości
- d) grzebiuszka ziemna posiada jednolicie ubarwiony, brunatny grzbiet

18. Samce żab moczarowych w okresie godowym przybierają barwę:

- a) żółtą
- b) brunatną
- c) niebieską
- d) jasnozieloną

24. Ropuchę zieloną, poza okresem godowym, spotkamy głównie:

- a) w lasach liściastych
- b) w pobliżu jezior
- c) na terenach zurbanizowanych
- d) w rwących rzekach